



UCB
News

Cimzia[®] (certolizumab pegol) approuvé par la FDA dans le traitement des patients adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif

- L'homologation est appuyée par les données issues de l'étude RAPID[™]-PsA, et représente la validation d'une troisième indication pour Cimzia[®] aux États-Unis

Bruxelles, Belgique – 30 septembre 2013, information réglementée : UCB a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé Cimzia[®] (certolizumab pegol) dans le traitement des patients adultes atteints de rhumatisme psoriasique (PsA) actif.

« L'homologation de Cimzia[®] par la FDA dans le traitement du PsA actif permet de proposer une option thérapeutique additionnelle et efficace aux personnes souffrant de cette maladie. Le rhumatisme psoriasique s'accompagne de difficultés qui apparaissent souvent durant les premières années, ce qui influe sur la qualité de vie sanitaire et la fonction physique », a déclaré Philip J. Mease, directeur de recherche en rhumatologie au centre médical suédois et professeur clinique à la faculté de médecine de l'Université de Washington à Seattle (États-Unis). « L'étude RAPID[™]-PsA sur laquelle se fonde l'approbation américaine est la première étude randomisée contrôlée d'un anti-TNF pour le PsA à inclure des patients exposés auparavant ou non à l'anti-TNF. Les résultats ACR20 montrent que Cimzia[®] a un impact rapide sur les signes et symptômes du PsA, avec pour certains patients une réponse observée dès la première semaine de traitement. »

« UCB jouit d'une longue expérience en rhumatologie, dont plusieurs années dans le domaine clinique avec Cimzia[®] dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère. Cette homologation représente la validation d'une troisième indication pour Cimzia[®] aux États-Unis, et réaffirme la valeur de notre engagement à développer des médicaments qui soignent des maladies chroniques graves et, de ce fait, à aider les personnes atteintes de PsA », a indiqué Iris Loew-Friedrich, Chief Medical Officer et Executive Vice President chez UCB.

Le PsA est une affection inflammatoire chronique qui provoque des douleurs, des gonflements et une raideur au niveau des articulations et des tendons. Il se conjugue en général avec le psoriasis^{1,2}. Chez la plupart des personnes atteintes de PsA, le psoriasis est antérieur à l'atteinte articulaire¹. Lorsque les mains et les pieds sont touchés par le PsA, une déformation des ongles peut avoir lieu, de même qu'un gonflement des doigts et des orteils (dactylite)¹. Le PsA touche environ 0,24 % de la population mondiale¹ ; jusqu'à 30 % des quelque 7,5 millions de patients atteints de psoriasis aux États-Unis développeront la maladie^{3,4}. Plusieurs études suggèrent que près d'une personne sur quatre souffrant de psoriasis aux États-Unis pourrait être atteinte de PsA sans le savoir².

L'homologation de Cimzia[®] par la FDA dans le traitement du PsA actif s'appuie sur les données issues de l'étude RAPID[™]-PsA, étude en cours de phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du certolizumab pegol

chez 409 patients adultes souffrant de PsA actif et évolutif. Les patients ont reçu une dose d'attaque de 400 mg de Cimzia® aux semaines 0, 2 et 4 ou un placebo, suivi(e) par 200 mg de Cimzia® une semaine sur deux, 400 mg toutes les quatre semaines ou un placebo une semaine sur deux. Ils ont été évalués afin de déterminer s'ils présentent des signes et des symptômes du PsA d'après le taux de réponse ACR 20 à la semaine 12, ainsi que des dommages structuraux d'après le score total de Sharp modifié (mTSS) à la semaine 24⁵.

Les taux de réponse ACR 20, 50 et 70 aux semaines 12 et 24 ont été plus élevés pour chaque groupe de patients traités par Cimzia® que pour le groupe placebo. Les patients traités par 200 mg de Cimzia® une semaine sur deux ont présenté une progression radiographique moins marquée que chez ceux traités par placebo à la semaine 24, d'après la variation du mTSS par rapport à l'état initial. Les patients traités par 400 mg de Cimzia® toutes les quatre semaines n'ont pas présenté une progression radiographique moins marquée que chez ceux traités par placebo à la semaine 24. Le traitement par Cimzia® a également entraîné une amélioration des manifestations cutanées chez les patients atteints de PsA. Toutefois, l'innocuité et l'efficacité de Cimzia® dans le traitement des patients souffrant de psoriasis en plaques n'ont pas été établies⁶.

Des effets indésirables ont été observés chez 62 % des sujets faisant partie du groupe certolizumab pegol (dose combinée), contre 68 % pour les patients du groupe placebo. Des effets indésirables ont été observés chez 7 % des sujets faisant partie du groupe certolizumab pegol (dose combinée), contre 4 % pour les patients du groupe placebo⁷. Le profil d'innocuité pour les sujets atteints de PsA traités par Cimzia® était similaire à celui observé pour les sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde (RA) et ceux ayant déjà été traités par Cimzia®. Veuillez consulter les informations importantes relatives à l'innocuité de Cimzia® à la fin du présent communiqué de presse pour plus de détails concernant les effets indésirables associés au produit.

Aux États-Unis, le médicament est également approuvé pour le traitement des patients adultes souffrant de polyarthrite rhumatoïde active dans sa forme modérée à sévère. Il y est en outre approuvé pour réduire les signes et symptômes de la maladie de Crohn et maintenir une réponse clinique chez les patients adultes présentant une maladie active modérée à sévère, répondant de façon inadéquate aux thérapies conventionnelles⁷. La FDA examine aussi une demande d'homologation de Cimzia® dans le traitement des adultes atteints de spondylarthrite axiale (SpA axiale) active, et notamment de spondylarthrite ankylosante (SA).

En combinaison avec le méthotrexate (MTX), Cimzia® est homologué dans l'Union européenne pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère chez des patients adultes qui ne répondent pas favorablement aux traitements de fond, y compris au MTX. Cimzia® peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou lorsqu'un traitement continu par le méthotrexate est contre-indiqué⁸.

L'Agence européenne des médicaments examine actuellement une demande d'homologation du certolizumab pegol dans le traitement des patients adultes atteints de PsA actif. En septembre 2013, le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis positif recommandant l'extension de l'autorisation de mise sur le marché en Union européenne de Cimzia® dans le traitement des patients adultes atteints de SpA axiale active sévère. Une décision finale de la Commission européenne est attendue dans les deux prochains mois.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À L'INNOCUITÉ DE CIMZIA® AUX ÉTATS-UNIS**Risque d'infections graves et d'affections malignes**

Les patients traités par CIMZIA® ont un risque accru de développer des infections graves pouvant nécessiter une hospitalisation ou entraîner la mort. La plupart de ceux ayant développé ces infections prenaient en concomitance des immunodépresseurs tels que le méthotrexate ou des corticostéroïdes. Il est recommandé d'interrompre l'administration de CIMZIA® si le patient développe une infection ou un sepsis grave. Les infections rapportées sont notamment les suivantes :

- Tuberculose active, à savoir réactivation de la tuberculose latente. Les tuberculeux ont fréquemment présenté des maladies disséminées ou extrapulmonaires. Les patients devraient subir un test de dépistage de la tuberculose latente avant d'utiliser CIMZIA® ainsi que durant la thérapie. Le traitement contre les infections latentes devrait débuter avant l'utilisation de CIMZIA®.
- Infections fongiques invasives (histoplasmosse, coccidioïdomycose, candidose, aspergillose, blastomycose et pneumocystose). Les malades souffrant d'histoplasmosse ou d'autres infections fongiques invasives peuvent présenter des maladies disséminées, et non pas localisées. Les tests de dépistage de l'histoplasmosse fondés sur la recherche d'antigènes et d'anticorps peuvent donner des résultats négatifs chez certains sujets atteints d'infections actives. Il convient d'envisager un traitement empirique des infections fongiques chez les patients vulnérables qui développent des maladies systémiques graves.
- Infections bactériennes, virales et autres causées par des pathogènes opportunistes, notamment les *Legionella* et les *Listeria*.

Les risques et avantages du traitement avec CIMZIA® devraient être étudiés attentivement avant de commencer la thérapie chez les sujets atteints d'infections chroniques ou récurrentes. Durant et après le traitement avec CIMZIA®, les patients devraient être suivis de près afin de surveiller l'apparition de signes et de symptômes d'infections, en particulier une tuberculose éventuelle chez ceux dont les résultats ont été négatifs lors du test de dépistage de la tuberculose latente effectué avant le début de la thérapie.

Des lymphomes et autres affections malignes, parfois mortelles, ont été rapportés chez des enfants et adolescents traités par des antagonistes du TNF, dont CIMZIA® fait partie. Le produit n'est pas indiqué chez les patients pédiatriques.

Les sujets traités par CIMZIA® ont un risque accru de développer des infections graves touchant divers organes ou systèmes d'organes, et pouvant nécessiter une hospitalisation ou entraîner la mort. Des infections opportunistes dues aux pathogènes bactériens, mycobactériens, fongiques invasifs, viraux, parasites ou autres (aspergillose, blastomycose, candidose, coccidioïdomycose, histoplasmosse, légionellose, listériose, pneumocystose et

tuberculose) ont été signalées chez des malades sous anti-TNF. Les patients ont fréquemment présenté des maladies disséminées, et non pas localisées.

Il est déconseillé de démarrer le traitement par CIMZIA® chez les patients porteurs d'une infection active, en particulier des infections localisées cliniquement importantes. Il est recommandé d'interrompre l'administration de CIMZIA® si le patient développe une infection ou un sepsis grave. Les risques d'infection peuvent être plus élevés chez les sujets de plus de 65 ans, atteints de comorbidité et/ou prenant en concomitance des immunodépresseurs (corticostéroïdes ou méthotrexate, par exemple). Les patients qui développent une nouvelle infection durant le traitement par CIMZIA® devraient être suivis de près, faire rapidement l'objet d'un bilan complet spécifique aux immunodéprimés et commencer un traitement antimicrobien approprié. Il convient également d'envisager, parallèlement aux examens, un traitement empirique des infections fongiques approprié chez les patients qui développent une maladie systémique grave et qui résident ou séjournent dans des régions à haut risque de mycoses endémiques.

Affections malignes

Durant les études contrôlées et ouvertes de CIMZIA® dans le traitement de la maladie de Crohn et d'autres pathologies, des affections malignes (hormis les cancers cutanés non mélaniques) ont été observées à un taux de 0,5 pour 100 années-patients chez 4 650 sujets traités par CIMZIA®, contre un taux de 0,6 pour 100 années-patients chez 1 319 sujets traités par placebo. Dans les études réalisées pour le traitement de la maladie de Crohn et d'autres fins expérimentales, on a relevé un cas de lymphome parmi 2 657 patients traités par le produit et un cas de lymphome de Hodgkin chez 1 319 patients traités par placebo. Durant les études cliniques (ouvertes et contrôlées par placebo) de CIMZIA® dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, trois cas de lymphome ont été observés parmi 2 367 patients. Ce résultat est environ deux fois plus élevé que prévu chez la population en général. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, notamment ceux présentant des pathologies fortement actives, ont un risque accru de développer des lymphomes. On ignore le rôle que pourrait jouer les traitements anti-TNF dans l'apparition d'affections malignes.

Des affections malignes, parfois mortelles, ont été signalées chez des enfants, des adolescents et de jeunes adultes (début de la thérapie avant l'âge de 18 ans) traités par des antagonistes du TNF, dont CIMZIA® fait partie. Environ la moitié de ces cas se sont avérés être des lymphomes (de Hodgkin et autres), tandis que les autres cas ont représenté diverses affections malignes différentes, dont des formes rares associées à l'immunodépression et d'autres formes généralement observées chez les enfants et adolescents. La plupart des patients recevaient en concomitance des immunodépresseurs.

Des cas de leucémie aiguë et chronique ont été rapportés suite à l'utilisation d'anti-TNF. Même en l'absence de tels traitements, les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde peuvent avoir un risque plus élevé (de deux fois environ) que la population en général de développer une leucémie.

Il est recommandé à tous les patients de passer des examens périodiques de la peau, en particulier à ceux présentant des facteurs de risque de cancer de la peau.

Insuffisance cardiaque

Des cas d'insuffisance cardiaque congestive (ICC) aggravée et de nouveaux cas d'apparition de l'affection ont été déclarés avec l'utilisation d'inhibiteurs du TNF. CIMZIA® n'a pas fait l'objet d'une étude formelle chez les sujets atteints d'ICC. Il convient de se montrer prudent lors de l'administration du médicament chez des patients souffrant de cardiopathie et de les suivre de près.

Hypersensibilité

Des symptômes compatibles avec des réactions d'hypersensibilité (angioœdème, dyspnée, hypotension, éruptions cutanées, maladie sérique et urticaire) ont rarement été signalés suite à l'administration de CIMZIA®. En cas de pareilles réactions, il convient d'interrompre l'utilisation du produit et d'entamer une thérapie appropriée.

Réactivation de l'hépatite B

L'utilisation d'antagonistes du TNF, dont CIMZIA®, peut augmenter le risque de réactivation du virus de l'hépatite B (VHB) chez les patients qui en sont porteurs chroniques. Certains cas ont entraîné la mort. Il convient de diagnostiquer la présence ou non du VHB chez les patients avant d'initier le traitement par CIMZIA®. La prudence est de mise lors de la prescription du médicament chez des patients identifiés comme étant porteurs du VHB, lesquels doivent faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi rigoureux avant et durant le traitement. Chez les sujets qui développent une réactivation du virus, l'administration de CIMZIA® doit être interrompue et un traitement antiviral efficace entamé en association avec un adjuvant approprié.

Réactions neurologiques

L'utilisation d'antagonistes du TNF, dont CIMZIA®, a été associée à de rares cas de nouvelle apparition ou d'aggravation de symptômes cliniques et/ou de preuves radiographiques de maladies démyélinisantes du système nerveux central, notamment la sclérose en plaques, ainsi qu'à des neuropathies périphériques, dont le syndrome de Guillain-Barré. De rares cas de troubles neurologiques (épilepsie, névrite et neuropathie périphérique) ont été déclarés chez les patients traités par CIMZIA®. La prudence est de mise lors d'une éventuelle administration du médicament chez des malades présentant ces types de troubles.

Réactions hématologiques

De rares cas de pancytopenie (notamment l'insuffisance médullaire) ont été rapportés dans le cadre d'une utilisation d'anti-TNF. Des manifestations de cytopénie médicalement importantes (leucopénie, pancytopenie ou thrombocytopénie, par exemple) ont été signalées de manière exceptionnelle chez les malades traités par CIMZIA®. Il y a lieu de conseiller à tous les patients de se faire consulter immédiatement afin de déterminer s'ils présentent des signes et des symptômes évoquant une dyscrasie ou une infection du sang (fièvre persistante, contusions, hémorragies ou pâleur, par exemple) durant le traitement par CIMZIA®. L'interruption du médicament est à envisager pour les patients chez lesquels des anomalies hématologiques importantes ont été confirmées.

Interactions médicamenteuses

Un risque accru d'infections graves a été observé dans des études cliniques portant sur d'autres inhibiteurs du TNF utilisés en association avec l'*anakinra* ou l'*abatacept*. Des études formelles sur les interactions médicamenteuses ont été réalisées avec le *rituximab* ou le *natalizumab*. Toutefois, en

raison de la nature des effets indésirables qui se sont déclarés en associant ces produits aux traitements anti-TNF, des toxicités similaires peuvent également résulter de l'utilisation de CIMZIA[®] avec ces mêmes produits. Par conséquent, l'association du médicament avec l'*anakinra*, l'*abatacept*, le *rituximab* ou le *natalizumab* est fortement déconseillée. Des interférences avec certains tests de coagulation ont été détectées chez des patients traités par CIMZIA[®]. Il est également prouvé que le traitement a une incidence sur la coagulation in vivo. CIMZIA[®] peut entraîner, chez les sujets dont la coagulation est normale, des taux faussement élevés lors des tests de coagulation sanguine.

Auto-immunité

Le traitement par CIMZIA[®] peut provoquer l'apparition d'autoanticorps et, dans de rares cas, le développement d'un syndrome rappelant ceux du lupus. Il convient d'interrompre le traitement si de tels symptômes apparaissent.

Immunisations

L'administration simultanée de vaccins vivants ou atténués avec CIMZIA[®] n'est pas recommandée.

Effets indésirables

Durant les études cliniques contrôlées de CIMZIA[®] dans le traitement de la maladie de Crohn, les effets indésirables les plus couramment observés chez au moins 5 % des patients (n = 620) et plus fréquemment que pour le placebo (n = 614) ont été les suivants : infection des voies respiratoires supérieures (20 % contre 13 %), infection urinaire (7 % contre 6 %) et arthralgie (6 % contre 4 %). La proportion de malades ayant interrompu le traitement en raison d'effets indésirables révélés par ces études s'est élevé à 8 % pour CIMZIA[®] et à 7 % pour le placebo.

Durant les études cliniques contrôlées de CIMZIA[®] dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, les effets indésirables les plus couramment observés chez au moins 3 % des patients prenant le médicament (à raison de 200 mg toutes les deux semaines) en concomitance avec le méthotrexate (n = 640) et plus fréquemment que pour le placebo associé au méthotrexate (n = 324) ont été les suivants : infection des voies respiratoires supérieures (6 % contre 2 %), céphalées (5 % contre 4 %), hypertension (5 % contre 2 %), rhinopharyngite (5 % contre 1 %), douleurs dorsales (4 % contre 1 %), pyrexie (3 % contre 2 %), pharyngite (3 % contre 1 %), éruptions cutanées (3 % contre 1 %), bronchite aiguë (3 % contre 1 %) et fatigue (3 % contre 2 %). L'hypertension s'est manifestée plus fréquemment chez les sujets recevant CIMZIA[®] que chez ceux traités par placebo. Ces effets indésirables sont survenus plus souvent chez les patients ayant déjà souffert d'hypertension par le passé ou recevant en concomitance des corticostéroïdes et des produits anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les malades recevant une dose de 400 mg de CIMZIA[®] en monothérapie toutes les quatre semaines, durant les études cliniques contrôlées du médicament dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, ont présenté des effets indésirables similaires à ceux des patients traités par une dose 200 mg toutes les deux semaines. La proportion de malades ayant interrompu le traitement en raison d'effets indésirables révélés par ces études s'est élevé à 5 % pour CIMZIA[®] et à 2,5 % pour le placebo.

Le profil d'innocuité pour les sujets atteints de PsA traités par CIMZIA[®] était similaire à celui observé pour les sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde (RA) et ayant déjà été traités par CIMZIA[®].

Pour connaître toutes les informations de prescription : www.ucb.com.

http://www.ucb.com/_up/ucb_com_products/documents/Cimzia_COL_11_2012.pdf

Informations importantes relatives à l'innocuité de Cimzia® (*certolizumab pegol*) dans l'UE et l'EEE*

Cimzia® a fait l'objet d'une étude ouverte et contrôlée de 92 mois au plus chez 4 049 patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Les effets indésirables fréquemment signalés (dans 1 % à 10 % des cas) durant des études cliniques de Cimzia® et après commercialisation ont été les suivants : infections virales (herpès, papillomavirus, grippe, etc.), infections bactériennes (abcès, etc.), éruptions cutanées, céphalées (migraine, etc.), asthénie, leucopénie (lymphopénie, neutropénie, etc.), anomalies des éosinophiles, douleurs (tous sites), pyrexie, troubles sensoriels, hypertension, prurit (tous sites), hépatite (augmentation des enzymes hépatiques, etc.), réactions au site d'injection et nausées. Les effets indésirables graves sont notamment les suivants : sepsis, infections opportunistes, tuberculose, zona, lymphome, leucémie, tumeurs solides des organes, œdème de Quincke, cardiomyopathie (insuffisance cardiaque, etc.), coronaropathie ischémique, pancytopenie, coagulation excessive (thrombophlébite, embolie pulmonaire, etc.), accident vasculaire cérébral, vascularite, hépatite/hépatopathie (cirrhose, etc.) et insuffisance rénale/néphropathie (néphrite, etc.). Durant des études cliniques contrôlées de la polyarthrite rhumatoïde, 4,4 % des patients ont interrompu le traitement par Cimzia® en raison d'effets indésirables, contre 2,7 % pour le groupe placebo.

Cimzia® est contre-indiqué chez les patients souffrant d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, de tuberculose active ou d'autres infections graves telles que le sepsis, les infections opportunistes ou l'insuffisance cardiaque modérée à sévère.

De graves infections telles que le sepsis, la tuberculose et les infections opportunistes ont été signalées chez des patients traités par Cimzia®. Certains de ces cas ont entraîné la mort. Il convient de surveiller attentivement l'apparition de signes et de symptômes d'infection (notamment tuberculeuse) chez ces patients, pendant et après le traitement par Cimzia®. Le traitement ne doit pas être initié chez les patients porteurs d'une infection active cliniquement importante. En cas d'apparition d'une infection, il convient de procéder à un suivi attentif, et d'interrompre l'administration de Cimzia® si l'infection s'aggrave. Avant le début du traitement par Cimzia®, tous les patients doivent être évalués afin de déterminer la présence ou non d'une infection tuberculeuse active ou inactive (latente). Si une tuberculose active est diagnostiquée avant ou pendant le traitement par Cimzia®, celui-ci ne doit pas être initié ou doit être interrompu. Si une tuberculose latente est diagnostiquée, un traitement antituberculeux approprié doit alors être initié avant le début de celui par Cimzia®. Il est recommandé aux patients de demander un avis médical si des signes ou symptômes suggérant une infection tuberculeuse (toux insistante, perte de poids, légère fièvre, apathie, etc.) apparaissent pendant ou après le traitement par Cimzia®.

Une réactivation de l'hépatite B s'est produite chez des patients recevant un antagoniste du TNF (dont Cimzia®) qui sont porteurs chroniques du virus (présence d'antigènes de surface). Certains cas ont entraîné la mort. Il convient de diagnostiquer la présence ou non du VHB chez les patients avant d'initier le traitement par Cimzia®. Les porteurs du virus qui nécessitent ce traitement doivent être suivis attentivement et, en cas de réactivation du VHB, l'administration du médicament doit être interrompue. Il convient dès lors de démarrer un traitement antiviral efficace en association avec un adjuvant approprié.

Les antagonistes du TNF (dont Cimzia®) peuvent accroître le risque de nouvelle apparition ou d'aggravation des symptômes cliniques et/ou des signes radiographiques d'une maladie démyélinisante ; de formation d'autoanticorps ou, plus rarement, du développement d'un syndrome lupoïde ; et de réactions d'hypersensibilité sévères. Si un patient présente l'un quelconque de ces effets indésirables, il est recommandé d'interrompre Cimzia® et de démarrer un traitement approprié.

En l'état actuel des connaissances, on ne peut écarter le risque qu'apparaissent des lymphomes, une leucémie ou d'autres affections malignes chez des patients traités par un antagoniste du TNF. De rares cas de troubles neurologiques (épilepsie, névrite et neuropathie périphérique) ont été déclarés chez les patients traités par Cimzia®.

Des effets indésirables du système hématopoïétique (notamment des manifestations de cytopénie médicalement importantes) ont été fréquemment rapportés chez les malades traités par Cimzia®. Il y a lieu de conseiller à tous les patients de se faire consulter immédiatement afin de déterminer s'ils présentent des signes et des symptômes évoquant une dyscrasie ou une infection du sang (fièvre persistante, contusions, hémorragies ou pâleur, par exemple) durant le traitement par Cimzia®. L'interruption du médicament est à envisager pour les patients chez lesquels des anomalies hématologiques importantes ont été confirmées.

L'utilisation de Cimzia® en association avec l'*anakinra* ou l'*abatacept* n'est pas recommandée en raison d'un risque accru d'infections graves. En l'absence de données, il est déconseillé d'administrer le médicament en concomitance avec des vaccins vivants. La demi-vie (14 jours) de Cimzia® doit être prise en considération si une intervention chirurgicale est prévue. Il convient de surveiller attentivement l'apparition d'infections chez tout patient traité par Cimzia® qui doit être opéré.

Pour connaître les autres effets indésirables, ainsi que toutes les informations concernant l'innocuité et la posologie du produit, veuillez consulter les informations de prescription complètes. Date de révision du RCP européen : 12 août 2013.

http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001037/WC500069763.pdf

Références

1. Genetics Home Reference, section « Psoriatic Arthritis ». Site Web consulté en septembre 2013 à l'adresse suivante : <http://ghr.nlm.nih.gov/condition/psoriatic-arthritis>
2. National Psoriasis Foundation. [Faits concernant le psoriasis et le rhumatisme psoriasique]. Site Web consulté en septembre 2013 à l'adresse suivante : <http://www.psoriasis.org/document.doc?id=191>

3. National Psoriasis Foundation, section « About Psoriasis ». Site Web consulté en septembre 2013 à l'adresse suivante : <https://www.psoriasis.org/about-psoriasis>
4. National Psoriasis Foundation, section « About Psoriatic Arthritis ». Site Web consulté en septembre 2013 à l'adresse suivante : <https://www.psoriasis.org/psoriatic-arthritis>
5. Mease, P., Fleischmann, R. M. *et al.*, « Effect of certolizumab pegol on signs and symptoms in patients with psoriatic arthritis: 24-week results of a Phase 3 double-blind randomized placebo-controlled study (RAPID-PsA) », *Ann Rheum Dis*, doi:10.1136/annrheumdis-2013-203696, 2013. Site Web consulté en septembre 2013 à l'adresse suivante : <http://ard.bmj.com/content/early/2013/08/28/annrheumdis-2013-203696.full.pdf>
6. Informations concernant la prescription de Cimzia® aux États-Unis. Site Web consulté en septembre 2013 à l'adresse suivante : http://www.ucb.com/up/ucb_com_products/documents/Cimzia_COL_11_2012.pdf
7. Mease, P., Fleischmann, R. M. *et al.*, « Effect of certolizumab pegol on signs and symptoms in patients with psoriatic arthritis with and without prior anti-TNF exposure: 24 week results of a phase 3 double-blind randomized placebo-controlled study », *Arthritis Rheum.*, doi:10.1136/annrheumdis-2013-203696, vol. 64, suppl. 10, 2012, S1107. Réunion de l'ACR et 47^e réunion annuelle de l'Association of Rheumatology Health Professionals (ARHP), Washington, D.C. (États-Unis).
8. Cimzia® : résumé des caractéristiques du produit de l'UE. Site Web consulté en septembre 2013 à l'adresse suivante : http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001037/WC500069763.pdf

Pour de plus amples informations :

- Andrea Levin, Associate Director, PR & Communications
Tél. : +1 770 970 83 52, andrea.Levin@ucb.com
- Eimear O'Brien, Director, Brand Communications
Tél. : +32 2 559 92 71, eimear.obrien@ucb.com
- Antje Witte, Investor Relations, UCB
Tél. : +32 2 559 94 14, antje.witte@ucb.com
- France Nivelles, Global Communications, UCB
Tél. : +32 2 559 91 78, france.nivelles@ucb.com
- Laurent Schots, Media Relations, UCB
Tél. : +32 2 559 92 64, laurent.schots@ucb.com
- Alexandra Deschner, Investor Relations, UCB
Tél. : +32 2 559 96 83, alexandra.deschner@ucb.com

À propos d'UCB

UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central. Employant plus de 9000 personnes réparties dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre d'affaires de € 3,4 milliards en 2012. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole : UCB).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations et convictions actuels du management. Toutes les déclarations, hormis celles qui ont trait à des faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, notamment les estimations du chiffre d'affaires, des marges d'exploitation, des dépenses en immobilisations, des liquidités, d'autres données financières, des résultats juridiques, politiques, réglementaires ou cliniques attendus et d'autres estimations et résultats. De par leur nature, ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de performances futures ; elles sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent donner lieu à des différences significatives entre les résultats réels et les résultats sous-entendus dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences : l'évolution du contexte économique général, du domaine d'activité et de la concurrence, l'impossibilité d'obtenir les homologations réglementaires nécessaires ou de les obtenir selon des conditions acceptables, les coûts associés à la recherche et développement, l'évolution des perspectives pour les produits du pipeline ou les produits en phase de développement par UCB, les effets de décisions judiciaires ou d'enquêtes publiques futures, les réclamations pour responsabilité du fait de produits, les obstacles à la protection des produits ou produits candidats par brevets, l'évolution de la législation ou de la réglementation, les fluctuations des taux de change, l'évolution ou les incertitudes de la législation fiscale ou de l'administration de cette législation, et le recrutement et la rétention des collaborateurs. UCB fournit ses informations à la date du présent communiqué de presse, et déclare expressément n'avoir nullement l'obligation d'actualiser les informations contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit pour confirmer les résultats réels ou faire état de l'évolution de ses attentes.

Rien ne permet de garantir que les nouveaux produits candidats du pipeline feront l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, ou que de nouvelles indications seront développées et homologuées pour les produits existants. S'agissant des produits ou produits potentiels qui font l'objet de partenariats, de joint ventures ou de collaborations pour l'obtention d'une homologation, des différences peuvent exister entre les partenaires. Par ailleurs, UCB ou d'autres sociétés pourraient identifier des problèmes de sécurité, des effets indésirables ou des problèmes de fabrication après la mise sur le marché de ses produits.

Enfin, le chiffre d'affaires peut être influencé par les tendances internationales et nationales en matière de soins gérés et de limitation des coûts liés à la santé, par les politiques de remboursement imposées par les tiers payeurs, ainsi que par la législation régissant la tarification et le remboursement des produits biopharmaceutiques.